Behandelstappen ASTMA kinderen

Op basis van voorkeur multidose, inhalator met een dosisteller of indicator, gebruiksgemak en mogelijkheid van eenheid in device bij verschillende behandelstappen en 1 techniek (o.a. NHG-standaard)

FORMULARIUM MIJN.streek

Stap 1: SABA *(zo nodig)*

Stap 2: ICS + SABA *(zo nodig)*

Stap 3: ICS/LABA + SABA
(start: alleen na verwijzing naar de 2e lijn)

	SABA	ICS	ICS/LABA (2e lijns-medicatie)
DOSIS-AEROSOL MET VOORZETKAMER	**Salbutamol** 100ug zn 1-4x 100ug - max elke 3 uur of 1600ug per dag	Vanaf 6 jaar: **Alvesco** (Ciclesonide) 80ug en 160ug 1 dd 80-160ug - max 2x320ug/dag **Beclometason** 50ug, 100ug en 250ug 1dd 100ug - max 500ug/keer en 1000ug/dag	**Foster** Beclometason/Formoterol 100/6ug en 200/6ug 2dd 100/6ug - max 8x200/6ug
DROOG POEDER INHALATOR	**Ventolin** Diskus Salbutamol 200ug zn 200ug - max 800ug	Vanaf 6 jaar: **Budesonide** Novolizer 200ug en 400ug 2dd 200ug - max 1600ug **Flixotide** Diskus Fluticason 100ug, 250ug en 500ug 2dd 100-500ug - max 2000ug/dag	**Seretide** Diskus Salmeterol/Fluticason 50/100ug, 50/250ug en 50/500ug 2dd 50/100ug – max 100/1000ug
VOORZET-KAMERS	<5 jaar: dosis-aerosol + voorzetkamer + masker 5-8 jaar: dosis-aerosol + voorzetkamer vanaf 7 jaar: keuze tussen dosis-aerosol en poederinhalator		

INCHECK DIAL		Met de In-check DIAL G16 kun je patiënten helpen om hun poeder- of dosis-aerosol-inhalatoren op de juiste manier te gebruiken. Het apparaat meet de flow-snelheid bij inademen en je kan er de weerstandskenmerken van de specifieke inhalator op instellen. De patiënt kan vervolgens getraind worden om te inhaleren met een flowsnelheid die geschikt is voor zijn of haar persoonlijke poeder of dosis aerosol inhalator.

Versienummer: oktober 2020